

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ БРОЙЛЕРОВ

Среднее выращивание птицы - 45 дней



ЮЖНАЯ КОРОНА

Брюховецкий комбикормовый завод

Наименования корма	Количество голов								
	1	10	20	30	40	50	60	100	150
СТАРТ (Бр-1) 1-14 дней (крупка)	0,6 кг	6 кг	12 кг	18 кг	24 кг	30 кг	36 кг	60 кг	90 кг
РОСТ (Бр-2) 15-28 дней (крупка)	1,5 кг	15 кг	30 кг	45 кг	60 кг	75 кг	90 кг	150 кг	225 кг
ФИНИШ (Бр-3) 29-45 (гранула)	2,55кг	25,5кг	51 кг	76,5 кг	102 кг	127,5 кг	153 кг	255 кг	382,5 кг

Потребность питьевой воды

- Особое внимание обратить **на постоянное наличие** чистой воды в поилках и свободный доступ цыплят к ним.
- Поилка должна быть хорошо освещена, т.к к плохо освещенной поилке цыплята не подходят.
- Отсутствие воды в течении 12 часов значительно влияет на рост цыплят.
- Обратите внимание на качество воды, используемой для поения цыплят.

Температурное содержание:

с 1 по 3 день	32 - 33 градусов
с 4 по 7 день	28 - 29 градусов
с 8 по 20 день	26 - 27 градусов
с 21 по 27 день	23 - 25 градусов
с 28 по 45 день	20 - 22 градуса

Необходим постоянный контроль за вентиляцией и влажностью помещения.