

Наименования корма	Возраст несушек	Расход комбикорма в среднем на одну голову гр/день	За весь период на одну голову/кг
ПК-2 СТАРТ (крупка)	0 - 7 недель	10 - 50 гр	1,7 кг
ПК-3 РОСТ (крупка)	8 - 20 недель	50 - 100 гр	5,7 кг
ПК-1 НЕСУШКА (крупка/гранула)	21 неделя и старше	100 - 120 гр	

- Используйте комбикорм в сухом виде.
- Установите рядом с комбикормом поилку с чистой водой.
- Соблюдайте гигиену кормления: мойте кормушки и поилки горячей водой, проводите регулярную дезинфекцию в птичнике.

Неделя выращивания	Температура в помещении	Температура под брудером	Относительная влажность воздуха
Суточные цыплята	28 °С	30 °С	75 - 77
1 - 2 недели	28 - 26 °С	35 - 30 °С	65 - 70
2 - 3 недели	26 - 22 °С	30 - 26 °С	65 - 70
4 - 6 недель	22 - 19 °С	-	65 - 70
7 и старше	19 - 17 °С	-	60 - 70

Только при выдерживании температурного режима можно сохранить хорошее состояние птицы и её производительность. Допустимая температура для разведения несушек – +5...+28 °С, оптимальная – +10...+25 °С. Для её регулирования в курятнике устанавливают термометр